

Hylophilus chariensis nov. sp.

Oblongus, nitidus, griseo-pubescens, testaceus, capite rufescente, oculis griseis, antennis pedibusque pro majore parte testaceis.

Oblong, brillant. orné d'une pubescence grise courte, en partie soulevée, testacé avec la tête roussâtre et les yeux gris, membres testacés avec une partie des cuisses postérieures obscurcie. Tête moyenne, distinctement ponctuée, tronquée postérieurement, yeux moyens, éloignés entre eux et aussi du bord postérieur de la tête; antennes insérées vers le bord des yeux, épaissies à l'extrémité, à 2^e article un peu épaissi; prothorax fortement et densément ponctué, presque carré, impressionné transversalement près de la base; élytres bien plus larges que le prothorax, assez courts, courtement rétrécis au sommet, déprimés vers la base, à ponctuation forte et rapprochée; pattes médiocres, antérieures et médianes grêles, cuisses postérieures très peu épaissies.

Longueur 2 millimètres environ.

Moyen Chari, Fort Archambault, février 1904.

Peut se placer près de *biafrensis* Pic; en diffère par la tête moins large, le prothorax à angles antérieurs distincts et la coloration plus pâle.

HYLOPHILUS (ADERUS) MACULARIS Pic.

Décrit de Guinée et retrouvé depuis dans le Congo. Les deux exemplaires rapportés par feu Decorse sont ainsi étiquetés: Bar-Banda méridional: Krébedjé (Fort Sibut), oct. et nov. 1904.

MISSION NIGER-TCHAD DIRIGÉE PAR LE CAPITAINE TILHO.

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR LE D^r GAILLARD.

COLÉOPTÈRES : ANTHICIDES NOUVEAUX [HÉTÉROMÈRES],

PAR M. PIC,

CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les espèces nouvelles ci-dessous décrites, qui ont été capturées par feu le D^r J. Decorse, au cours de la Mission Niger-Tchad, font partie des Collections du Muséum de Paris⁽¹⁾.

(1) Les quatre *Formicomus*, *Leptaleus Archambaulti* et *Anthicus impollutus* figurent aussi dans la collection Pic.

Formicomus (? Anthelephilus) brevipennis nov. sp. ♂.

Convexus, nitidus, nigro-piceus, antennis plus minusve et femoribus ad basim testaceis; femoribus et tibiis anticis dentatis, elytris apice truncatis.

Convexe avec les élytres en ovale court, brillant, éparsément pubescent de gris, noir de poix ou brunâtre avec les antennes, à la base, plus ou moins et la base des cuisses testacées. Tête allongée, rétrécie en arrière; prothorax long, assez élargi en avant, étranglé près de la base, médiocrement gibbeux et bituberculé sur sa partie basale; élytres courts et larges, à épaules à peine marquées, tronqués ou subtronqués au sommet; pattes robustes, cuisses antérieures munies d'une dent courte et robuste, tibiais brièvement dentés et échancrés ensuite vers leur sommet interne.

Longueur : 4 millimètres environ.

Haut Ouhangui, Fort de Possel, septembre 1904.

Très voisin de *Gestroi* Pic, en diffère par l'armature différente des pattes antérieures et la coloration un peu plus foncée.

Formicomus longipennis nov. sp.

Elongatus et satis angustatus, nitidus, niger aut nigro-piceus, elytris viridescentibus, antennis ad basim testaceis; femoribus anticis dentatis, tibiis fere rectis.

Allongé et assez étroit, brillant, éparsément pubescent de gris, noir, ou noir de poix, avec les élytres verdâtres et la base des antennes testacée. Tête grosse, arquée postérieurement; prothorax assez long, fortement élargi en avant, éparsément ponctué; élytres longs, subparallèles, un peu rétrécis et subarrondis en oblique au sommet; cuisses antérieures ♂ munies d'une dent pointue, pas très longue, et tibiais presque droits, faiblement dentés près du sommet; les pattes simples chez ♀.

Longueur : 5 millimètres.

Bahr-Salaat : Balabidja, au Nord-Est du Fort-Archambault, mars 1904.

Par sa forme allongée peut prendre place près de *indigaceus* Laf.; paraît en différer par la tête large, la coloration plus foncée des pattes, etc.

Formicomus Bouvieri nov. sp.

Nitidus, niger, elytris viridescentibus, antennis ad basim testaceis; elytris satis brevibus; femoribus anticis ♂ dente apice truncato munitis, tibiis dentatis.

Brillant, orné d'une pubescence grise éparse en partie redressée, noir avec les élytres verdâtres, les antennes plus ou moins testacées à la base. Tête longue, très rétrécie en cône postérieurement; prothorax assez long, modérément dilaté en avant, à base faiblement élevée; élytres relativement courts, subovalaires, un peu rétrécis et subarrondis au sommet; cuisses

antérieures ♂ armées d'une dent assez longue, tronquée au sommet et tibias au milieu avec une dilatation interne plus ou moins anguleuse au sommet et qui, vue obliquement, fait paraître parfois ces organes bidentés; les pattes simples chez ♀.

Longueur: 4-4.5 millimètres.

Bassin du Chari entre Nana et Dekoua, bords de la rivière Fo; pays Mandjia au poste des Trois Marigots, janvier 1904.

Par la structure des pattes antérieures du ♂ se rapproche de *Bogasi* Pic; il en diffère nettement par sa coloration plus foncée et sa forme élytrale moins allongée.

Formicomus spinifer nov. sp.

Satis elongatus, nitidus, niger, elytris viridescens aut subviolaceis, albo fasciatis, antennis ad basim rufescentibus; femoribus anticis ♂ spinosis, tibiis medioere lunatis.

Assez allongé, brillant, orné d'une pubescence grise éparsée en partie redressée avec, sur les élytres, une bande transversale autémédiane de poils blancs peu serrés, noir avec les élytres verdâtres ou un peu violacés, base des antennes roussâtre. Tête assez grosse, rétrécie en arc postérieurement; prothorax assez long, fortement dilaté en avant; élytres en ovale allongé, un peu rétrécis et subarrondis au sommet; cuisses antérieures ♂ munies d'une longue épine pointue; tibias sinués, plus ou moins faiblement échancrés vers leur sommet; ces membres simples chez ♀.

Longueur: 4.5-5 millimètres.

Moyen Chari, Fort Archambault, février et mars 1904.

Voisin de *alboineatus* Pic, en diffère par la dent très longue des cuisses antérieures ♂, la bande élytrale de poils blancs, moins condensée, etc.

Je rapporte à cette espèce, à titre de variété, quelques exemplaires, de la Rivière Gribingui, de forme un peu moins allongée avec les élytres parfois d'un vert bleuâtre.

Leptaleus Archambaulti nov. sp.

Satis elongatus, nitidus, niger aut nigro-piceus, elytris ad basim et lateraliter albo maculatis, antennis ad basim aliquot et tarsis testaceis.

Assez allongé, brillant, courtement et éparsément pubescent de gris, noir, ou noir de poix, avec les élytres ornés près de la base d'une macule latérale blanche placée dans une dépression nette, base des antennes parfois et tarses testacés. Tête grosse, subtronquée ou faiblement arquée en arrière, fortement ponctuée; prothorax fortement élargi en avant, à base un peu élargi; élytres déprimés, subparallèles, peu longs, assez finement ponctués; pattes robustes, premier article des tarses antérieurs parfois un peu dilaté, sans doute chez ♂.

Longueur: 2 millim. 5 environ.

Moyen Chari, Fort Archambault, février et mars 1904.

Très voisin de *unifasciatus* v. *erytræus* Pic, en diffère par la tête subtronquée postérieurement, fortement ponctuée et la macule blanche plus large des élytres.

***Anthicus inæqualiceps* nov. sp.**

Brevis, robustus, convexus, testaceus, antennis brevibus, apice dilatatis; capite inæqualiter sat forte punctato.

Petit, robuste et convexe, brillant, pubescent de gris, entièrement testacé-pâle avec le sommet des antennes et les pattes un peu rembrunis. Tête fortement et inégalement ponctuée, à ligne médiane lisse, subtronquée, non élargie derrière les yeux, qui sont gris; antennes courtes, très épaissies vers le sommet; prothorax court, très élargi triangulairement en avant, densément ponctué; élytres courts et larges, rétrécis postérieurement, à ponctuation forte et rapprochée.

Longueur : 1 millim. 5 environ.

Rives du Moyen Chari à Demraou, juin 1904.

Espèce des plus distinctes par la sculpture de la tête jointe à sa petite taille; peut se placer près de *crassicollis* Fairm.

***Anthicus distincticornis* nov. sp.**

Satis elongatus, subparallelus, nitidus, niger, pedibus pro parte testaceis; antennis validis, articulis 4-11 crassioribus aut subdentatis.

Assez allongé, subparallèle, brillant, orné d'une pubescence grise peu longue en partie redressée, noir avec les pattes testacées à cuisses rembrunies. Tête grosse, fortement ponctuée, tronquée et impressionnée au milieu postérieurement; antennes noires, vaguement roussâtres sur une partie des premiers articles, robustes, à articles 4 et suivants fortement élargis ou plus ou moins dentés en dehors, atteignant la base des élytres; prothorax un peu plus long que large, fortement dilaté en avant, presque droit sur les côtés de la base, à ponctuation forte et rapprochée; élytres relativement longs, subparallèles, faiblement rétrécis au sommet, à ponctuation plus ou moins forte et espacée, légèrement impressionnés près de la base; pattes assez robustes.

Longueur : 4 millimètres.

Congo, Brazzaville, juillet 1904.

Ressemble à notre espèce paléarctique *ater* Panz.; il est plus grand avec les antennes robustes, subdentées, de forme très particulière et, par ce dernier caractère, très facile à reconnaître à première vue.

***Anthicus inattenuatus* nov. sp.**

Satis elongatus, subparallelus, nitidus, plus minusve rufescentibus elytris nigris, ad basim rufo fasciatis, tibiis tarsisque luteis.

Assez allongé, subparallèle, assez brillant, orné d'une pubescence grise peu longue et couchée, en majeure partie roussâtre; tête et sommet de l'abdomen un peu rembrunis; élytres noirs ornés, près de la base, d'une fascie rousse subtransversale assez large. Tête longue et robuste, subtronquée, assez fortement et très densément ponctuée avec une faible ligne médiane lisse; antennes rousses, assez robustes, n'atteignant pas la base des élytres; prothorax un peu plus long que large, faiblement élargi en avant, fortement et assez densément ponctué; élytres relativement longs, subparallèles, faiblement rétrécis au sommet, à ponctuation forte, assez rapprochée; pattes robustes, cuisses rousses, tibias et tarses jaunes.

Longueur : 4 millimètres environ.

Nord-Est du Fort Archambault, Mara-Goulfez, septembre 1904.

Voisin du précédent par sa forme, mais tout autre par sa coloration et la structure des antennes; par sa coloration ressemble, d'autre part, à *mala-barensis* Pic.

***Anthicus Decorsei* nov. sp.**

Oblongus, rufescens, longe pilosus, capite thoraceque densissime punctatis, fere opacis, elytris nitidis.

Oblong, entièrement roussâtre, orné d'une pubescence grise longue en partie soulevée, avant-corps densément ponctué et presque mat, élytres brillants, à ponctuation forte, plus ou moins rapprochée. Tête subarquée postérieurement; antennes peu longues, subfiliformes; prothorax un peu plus long que large, modérément élargi en avant, presque droit sur la base; élytres assez longs, rétrécis assez fortement en arrière, marqués d'une très faible dépression antérieure.

Longueur : 3 millimètres.

Bar-Banda méridional, Kréhédjé (Fort Sibut), novembre 1904.

Cette espèce ressemble à *A. rugosicollis* Pic. de la Nouvelle-Guinée, avec une forme moins allongée, la tête de forme différente, etc. Peut se placer près de *rugithorax* Pic; diffère de ce dernier, en dehors de la coloration, par la forme moins robuste de l'avant-corps et la tête d'une autre forme.

***Anthicus impollutus* nov. sp.**

Mediocre elongatus, subparallelus, nitidus, fere glaber, pro majore parte nigro-piceus, elytris plus minusve rufescensibus et brunneo maculatis.

Médiocrement allongé, subparallèle, brillant, presque glabre avec seulement une très courte pubescence couchée et espacée peu visible, en grande partie noir de poix, roussâtre quelquefois par place avec d'ordinaire la base du prothorax et partie des membres roussâtres; élytres plus ou moins rous et variablement maculés de brun vers la base, au milieu et près du sommet, les macules d'ordinaire éloignées de la suture. Tête grosse, subtronquée, fortement ponctuée, prothorax subtrapézoïdiforme, peu élargi en avant,

à ponctuation assez forte et écartée: élytres subparallèles, à dépression antérieure nette.

Longueur : 2,8-3 millimètres.

Moyen Chari, Fort Archambault, avril 1904.

Voisin de *floralis* L. et distinct, à première vue, par son système de coloration.

NOTE SUR LE *TABANUS AGRESTIS* WIEDEMANN,

PAR M. JACQUES SURCOUF,

CHEF DES TRAVAUX DE ZOOLOGIE AU LABORATOIRE COLONIAL DU MUSÉUM.

Le *Tabanus agrestis* a été décrit comme étant d'Égypte, par WIEDEMANN en 1828. WALKER le signale à nouveau en 1854.

Le Docteur WALTER INNÈS-BEY nous a adressé récemment de nombreux spécimens de Taons d'Égypte, mais le *Tabanus agrestis* ne s'y trouvait pas.

En juillet dernier, M. HUGUES ATGER nous a envoyé de la Camargue et de Saint-Geniès-de-Malgoirans (Gard) 7 exemplaires du *Tabanus agrestis* Wiedemann. D'après notre ami le Docteur VILLENEUVE, à qui nous les avons soumis, cette espèce avait été regardée par BRAUER comme une variété de *Tabanus fulvus*.

Le Docteur VILLENEUVE possède deux exemplaires identiques provenant de Lattes (Hérault) et les considère comme correspondant à la description de WIEDEMANN.

Il est possible qu'il y ait eu une erreur commise au début par WIEDEMANN; plus récemment, les Entomologistes tels que WALKER ont simplement reproduit sa diagnose et l'Insecte a été ainsi gratifié d'un habitat inexact.

Il y a donc lieu de considérer le *Tabanus agrestis* Wiedemann comme une espèce de France.

MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES DE L'ASIE ANTÉRIEURE
(2^e NOTE⁽¹⁾),

PAR M. LOUIS GERMAIN.

Avec M. J. DE MORGAN, j'entends par Asie Antérieure toutes les régions comprises au Sud des monts Caucase, au Sud de l'Atrek, à l'Ouest de l'In-

(1) La première note de cette série a paru dans le *Bulletin du Muséum* (XVII, 1911, n° 1, janvier, p. 27-32), sous le titre : *Note préliminaire sur les Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. H. GADEAU DE KERVILLE, pendant son voyage en Syrie.*